

กรณีที่มีการติดเชื้อของหญิงมีครรภ์



ถ้าหญิงมีครรภ์ไม่เคยติดเชื้อตั้งแต่เด็ก อาจเกิดโรครุนแรงและอาจมีผลต่อทารกในครรภ์ เมื่อมารดาไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส ทารกที่เกิดใหม่ก็ไม่ได้ภูมิคุ้มกันจากมารดา อาจติดเชื้อแพร่กระจาย ดังนั้น หญิงมีครรภ์ควรได้รับการดูแลใกล้ชิดจากแพทย์

วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส มีประโยชน์อย่างไร

วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส



นอกจากประโยชน์โดยตรง

ที่ช่วยป้องกันไม่ให้เป็นโรค

อีสุกอีใสแล้วยังมีประโยชน์อื่นๆ

อีกเช่น ลดความเสี่ยงต่อ การเกิดรอยแผลเป็นอันเนื่องมา

จากเป็นโรคอีสุกอีใส ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคแทรก

ซ้อนจาก การติดเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้นวัคซีนป้องกัน

โรคอีสุกอีใสแนะนำให้ฉีด ได้ในเด็กอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ซึ่งจากประสบการณ์ในประเทศญี่ปุ่นหลังฉีดวัคซีนเพียง

1 เข็ม ให้ภูมิคุ้มกันยาวนาน 20 ปี

การรักษา

การดูแลรักษาโดยทั่วไป

จะรักษาตามอาการไข้และ

อาการทางผิวหนัง โดยให้

ยาลดไข้ เช่น พาราเซตามอล (ห้ามให้แอสไพริน โดย

เด็ดขาด) ทำความสะอาดผิวหนังและให้ยาทาแก้คัน

นอกจากนี้อาจมีอาการให้ยาเพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อ

ไวรัสร่วมด้วย ทางที่ดีผู้ป่วยควรอยู่ในความดูแลของแพทย์



ไข่อสุก ใสหรืออีสุกอีใส



● งานสุกศึกษาและประชาสัมพันธ์



ไข่อสุกหรืออีสุกอีใส

สาเหตุ



เกิดจากเชื้อไวรัส
ทำให้เกิดผื่น
ลักษณะพุ่มพองที่ผิวหนัง

และเยื่อเมือกและน้ำจากตุ่มพองจะมีเชื้อจำนวนมาก
สามารถติดผู้อื่นได้

ไข่อสุกติดต่อง่าย ผู้ป่วยจะเกิดอาการของไข่อสุก
หลังจากได้รับเชื้อ 14-21 วัน เชื้อนี้จะระบาดในฤดูหนาว
มักเป็นในเด็กอายุ 5-9 ขวบ เมื่อเด็กเป็นแล้วจะมี
ภูมิคุ้มกันโรคนี้อาจจะติดชีวิตเชื้อมีไม่หายจากร่างกาย
มันคงอยู่ในเส้นประสาทเมื่อร่างกายอ่อนแอก็จะเกิด
เป็นโรคงูสวัด



อาการของโรคนี้

1.อาการนำ ในเด็กอาการไม่ชัดเจน แต่ในผู้ใหญ่



จะมีไข้ ปวดศีรษะ ปวดหลัง
เจ็บคอ ไอ

2.ระยะออกผื่น ผื่นพุ่มพองจะ
เริ่มที่ลำตัวหรือหน้า

หลังจากนั้นจะแพร่กระจายไปทั่วตัว ศีรษะ หู

อวัยวะเพศ ในปาก ฐานของผื่นจะมีสีแดง 2-4 วัน

ผื่นอาจจะรวมกันเป็นกลุ่ม ผู้ป่วยอาจจะมีผื่นจำนวน
น้อย แต่บางรายมีผื่นมาก

3.ผื่นพบตามตัว แขนขา

หน้าไม่ค่อยพบผื่น

มักพบส่วนต้นของแขนขา



ที่ใบหน้ามักพบครึ่งล่างมากกว่าครึ่งบน ผื่นมักพบตาม
รอยนูนของร่างกาย อวัยวะหรือเกาผื่นเพราะอาจจะทำ
ให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรีย

ผู้ป่วยอาจจะมีไข้ ปวดท้อง อาจคันบริเวณผื่น

อาการจะหายใน 3-5 วัน เด็กจะมีไข้ต่ำกว่าผู้ใหญ่

ความรุนแรงของโรค



คนปกติส่วนมาก หลังจากได้รับการดูแลรักษาพื้นฐาน
ก็ไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ

❖ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดได้ คือ อาจเกิดภาวะแทรกซ้อน
ติดเชื้อผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน ปอดบวม ภาวะพร่องน้ำ
สมองอักเสบ โดยภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยมากที่สุดที่
นำไปสู่การเสียชีวิต คือ ปอดบวม ภาวะแทรกซ้อนของ
ประสาทส่วนกลาง (รวมทั้งสมองอักเสบ) การติดเชื้อ
แบคทีเรีย และภาวะเลือดออก

❖ภาวะโรครุนแรง จะพบในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันด้านเซลล์ต่ำ
ไม่ว่าเป็นแต่กำเนิดหรือเนื่องจากเป็นมะเร็ง เช่น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว ผู้ที่ได้รับยาต้านมะเร็ง นอกจากนี้
แผลผื่นอาจเน่า และมีเลือดออก เชื้ออาจกระจายไปยัง
อวัยวะต่างๆ เช่น ปอด ตับ สมอง